


MANV

mStART Kinder Vorsicht Trauma



* Ungewöhnlicher Geruch nach Knoblauch, Senf, Fisch, Heu, Bittermandel, Chlor und/oder gleiche Vergiftungssymptome bei mehr als einer Person

mSTaRT Kinder

Vorsichtung Trauma



Altersgrenze Kind - Anwendung des Algorithmus „mSTaRT Kinder“:

Abhängig von der individuellen körperlichen Entwicklung des Kindes
(bis zum Beginn der Pubertät; 10-12 Jahre)

Öffnet Augen spontan Interagiert adäquat Spricht verständlich Verfolgt Gegenstände	A lert
Motorische, verbale oder sonstige Reaktion auf verbalen Stimulus (laut ansprechen oder berühren)	V erbal
Motorische, verbale oder sonstige Reaktion auf Schmerzreiz (z.B. Zwicken)	P ain
Keine motorische, verbale oder sonstige Reaktion	U nresponsive

** Notfallmaßnahmen bei SK I (rot)

Nicht Aufgabe des Sichtungsteams während der Vorsichtung !

Durchführung durch den Notarzt bzw. in Notkompetenz durch Rettungsfachpersonal.

- Atemwegssicherung (**Larynxmaske**, ggfs. Notfallintubation)
- Dringliche Intubation bei GCS kleiner 10 bzw. **AVPU „P“ oder „U“**, Blutung im Mund-Rachen-Raum oder Aspiration
- Beatmung über Maske oder Tubus
- Thoraxdekompression bei Spannungspneumothorax
- Blutstillung

*** Notdekontamination bei SK I und notwendigem Notfalltransport

- Entfernen der Kleidung
- ggfs. Abwaschen / Abtupfen mit Wasser oder Wasser-Seife-Gemisch